

# Classification de l'endométriiose

Nom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Intervention réalisée : \_\_\_\_\_

ENDOMÉTRIOSE		<1 cm	1-3 cm	>3 cm
<b>Péritoine</b>	Superficielle	1	2	4
	Profonde	2	4	6
<b>Ovaires</b>	Superficielle (côté droit)	1	2	4
	Profonde	4	16	20
	Superficielle (côté gauche)	1	2	4
	Profonde	4	16	20
OBLITÉRATION DU CUL-DE-SAC POSTÉRIEUR		Partielle	Complète	
		4	40	
ADHÉRENCES		Surface < 1/3	Surface de 1/3 - 2/3	Surface > 2/3
<b>Ovaires</b>	Fines (côté droit)	1	2	4
	Denses	4	8	16
	Fines (côté gauche)	1	2	4
	Denses	4	8	16
<b>Trompes</b>	Fines (côté droit)	1	2	4
	Denses	4 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	16
	Fines (côté gauche)	1	2	4
	Denses	4 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	16

1. Si l'extrémité fimbriée de la trompe utérine est complètement obstruée, établir le score à 16. Stades : stade I (minime) : 1-5; stade II (légère) : 6-15; stade III (modérée) : 16-40; stade IV (grave) : > 40. Revised ASRM Classification. *Fertil Steril* 1997; 67:819.


Autres renseignements relatifs à l'endométriose : \_\_\_\_\_

---

---

---

À utiliser si les trompes de Fallope et les ovaires sont normaux



Pathologie connexe : \_\_\_\_\_

---

---

---

À utiliser si les trompes de Fallope et les ovaires sont anormaux

